

KBC Bežanijska Kosa, Beograd

PLUĆA U ANTIFOSFOLIPIDNOM SINDROMU

Milanka Stanković, Ljudmila Stojanović, Mirjana Bukilica, Olivera Marković, Dragana Popović-Kuzmanović

Antifosfolipidni sindrom (AFS), kao pojam uveden je u medicinsku literaturu i praksu pre oko 20 godina. U odnosu na njegova brojna ispoljavanja na različite sisteme i organe u vidu tromboembolijskih manifestacija, plućne manifestacije su relativno retke. Težina kliničke slike i visoka smrtnost nalaže blagovremenu dijagnostiku. Bolesnici sa AFS mogu razviti široku paletu plućnih manifestacija, sem tromboembolija plućnih arterija, infarkta i plućne hipertenzije, tu su i alveolarne hemoragije i respiratorni distressindrom (ARDS) odraslih, postpartalni sindrom i dr.

U KBC "Bežanijska Kosa" u Beogradu, timski je praćeno i lećeno 8 bolesnica sa različitim manifestacijama AFS na plućima.

Sistemska eritemski lupus (SEL) je dijagnostikovana kod 6 bolesnica, a kod 2 primarna AFS (PAFS).

Dijagnoza SEL, odnosno PAFS postavljene su na osnovu važećih mađunarodnih kriterijuma.